

Valley View Drugs

IndoLidocream-105 (Indomethacin 10% Lidocaine 5%)

Ingredientes Activos:

Indomethacin 10%/Lidocaine 5%

Producto(s):

Indomethacin, una droga no-steroidal antiinflamatorio(NSAID) con analgésico y efectos anti-piréticos, es utilizado para tratar osteoartritis y controlar el dolor severo. Para moderado a severo artritis reumático incluyendo estallidos severo de enfermedades crónicas como ankylosing spondylitis, osteoartritis, dolor severo de hombro (bursitis y/o tendinitis) y artritis gotoso. Los efectos de Indomethacin crean que son del aumento en la ciclooxigenase en plaquetas, que dirigen el bloqueo del síntesis prostaglandino. Los efectos anti-piréticos son debidos al aumento del hypothalamus, resultando en un aumento periférico de un riego sanguíneo, vasolidation y disipación subsiguiente al calor. **Lidocaine** es un anestésico que tiene membranas de neurona que estabilizan los efectos. El lidocaine tópico es usualmente utilizado en combinación con otros agentes (NSAIDs, relajantes de músculos, NMDA-receptores antagonista, etc...). Lidocaine alivia el alivio bloqueando las señales en las conclusiones de nervio en la piel. Lidocaine causa entumecimiento de la piel y las mucosas, que tópicamente son utilizadas para el alivio del dolor.

Como usar su medicamento:

Applique a la piel intacta. Es mejor absorbida despues de aver aumentado la circulación, como despues de un baño tibio o aver aplicado una compresa caliente.

Efectos secundarios:

Efectos secundarios de estos medicamentos no son comun pero cuando son tomados oralmente incluyen: mareos, somnolencia, estómago disgustado, náusea, vomito, diarrea, gas, estreñimiento, nerviosismo o dolor de cabeza. Sin embargo, porque Indomethacin es topica, las oportunidades des estos efectos son minimos, excepto el sarpullido. Si es molesto, o si usted experiencia algunos otros efectos secundarios no mencionnados ponganse en contacto con su médico o farmacéutico. Deje de usar lidocaine tópicamente y busque atención medica o contacte a su médico inmediatamente si experiencia algunos de los siguientes raros pero **serios efectos secundarios:** Una reacción alérgica (dificultad al respirar; que se le siere la garganta; hincháson de los labios, lengua, o cara; sarpullido); dolor de pecho o latidos del corazón irregulares, mareos o somnolencia, nausea y/o vomito, temblorina, agitar o convulsiones, o vista borrosa o doble.Si es molesto, o si usted experiencia algunos otros efectos secundarios no mencionnados ponganse en contacto con su médico o farmacéutico.

Precauciones:

No use este medicamento si usted a tenido reacciones raras o reacciones alérgicas a los siguientes medicamentos: aspirina, ibuprofen, naproxen, o cualquier otro tipo de medicina utilizada para el dolor, fiebre, hinchason, o artritis. Este medicamento puede aumentar los efectos a los calmantes o alcohol cuando sea tomado oralmente. Es improbable cuando en la forma topica, pero hable con su medico o farmacéutico si tiene algunas preguntas.

Direcciones:

Este medicamento es para uso topico solamente. Aplique el recinto a la area afectada, en una capa lisa y delgada, dos o tres veces al dia(como sea necesario). Si usa un refuerzo sobre la gel, asegurese de que primero se seque la aria por aproximadamente 30 minutos. Esta gel se quita facilmente con agua. La crema se debe untar en las areas afectadas de 30-60 segundos. No use esta crema en la piel irritada, pelada, infectada o en heridas. Espere hasta que estas condiciones se alivien totalmente para poder utilizar la crema. Siempre siga las intrucciones de su medico o farmacéutico. Los pacientes no deben excedir las dosis prescrita por su medico.

Almacenamiento:

Este medicamento debe ser almacenado en una temperatura calida lejos del calor y la luz. Lejos del alcance de los niños.Esta informacion en esta distribución no es destinado a cubrir todo los posibles usos, direcciones, precauciones, o efectos adversos. Esta informacion esta generalizada y no es destinada a un consejo médico específico. Si usted tiene preguntas de estos medicamentos o gusta mas informacion, verifique con su médico y/o farmacéutico.

13966 Valley View Avenue
La Mirada, California 90638
Pharmacy Phone 562-941-1208
Pharmacy Fax 562-941-6398