

Valley View Drugs

BCKL Cream (Baclofen/Cyclobenzaprine/Ketoprofen/Lidocaine 2/2/15/5%)

Ingredientes Activos:

Baclofen 2%, Cyclobenzaprine 2%, Ketoprofen 15%, Lidocaine 5%

Producto(s):

Este medicamento topico es una combinacion de cuatro ingredientes activos: Ketoprofen, Baclofen, Cyclobenzaprine, y Lidocaine. **Ketoprofen** es utilizado para tratar la inflamacion y proporcionar la analgesia o eliminar el dolor. **Baclofen** relaja los músculos y es un agente anti espasmos. Baclofen se utiliza para tratar los espasmos musculares, dolor, y rigidez. **Cyclobenzaprine** es utilizado para tratar la tension muscular y proporcionar la analgesia. **Lidocaine** produce alivio al dolor bloqueando las señales en las conclusiones de nervio en la piel.

Como usar su medicamento:

Applique a la piel intacta. Es mejor absorbida despues de aver aumentado la circulación, como despues de un baño tibio o aver aplicado una compresa caliente.

Efectos secundarios:

Efectos secundarios de estos medicamentos no son comun pero cuando son tomados oralmente incluyen: mareos, somnolencia, estómago disgustado, náusea, vomito, diarrea, gas, estreñimiento, nerviosismo o dolor de cabeza. Sin embargo, porque BCKL es topica, las oportunidades des estos efectos son minimos, excepto el sarpullido. Si es molesto, o si usted experiencia algunos otros efectos secundarios no mencionnados ponganse en contacto con su médico o farmacéutico.

Precauciones:

No use este medicamento si usted a tenido reacciones raras o reacciones alérgicas a los siguientes medicamentos: aspirina, iboprofen, naproxen, o cualquier otro tipo de medicina utilizada para el dolor, fiebre, hinchason, o artritis. Este medicamento puede aumentar los efectos a los calmantes o alcohol cuando sea tomado oralmente. Es improbable cuando en la forma topica, pero discuta con su medico o farmacéutico si tiene algunas preguntas.

Direcciones:

Este medicamento es para uso topico solamente. Aplique el recinto a la area afectada, en una capa lisa y delgada, dos o tres veces al dia(como sea necesario). Si usa un refuerzo sobre la gel, asegurese de que primero se seque la aria por aproximadamente 30 minutos. Esta gel se quita facilmente con agua. La crema se debe untar en las areas afectadas de 30-60 segundos. No use esta crema en la piel irritada, pelada, infectada o en heridas. Espere asta que estas condiciones se aigan aliviado totalmente para poder utilizar la crema.

Siempre siga las intrucciones de su medico o farmacéutico. Los pacientes no deben excedir las dosis prescrita por su medico.

Almacenamiento:

Este medicamento debe ser almacenado en una temperatura calida lejos del calor y la luz lejos del alcance de los niños.

Esta informacion en esta distribución no es destinado a cubrir todo los posibles usos, direcciones, precauciones, o efectos adversos. Esta informacion esta generalizada y no es destinada a un consejo médico específico. Si usted tiene preguntas de estos medicamentos o gusta mas informacion, verifique con su médico y/o farmacéutico.

13966 Valley View Avenue
La Mirada, California 90638
Pharmacy Phone 562-941-1208
Pharmacy Fax 562-941-6398